

烟台市男男性行为人群干预工作情况简介


烟台市疾病预防控制中心

杨珊

2008年9月19日

烟台市艾滋病防治工作概况

- ▶ **目前流行形势：**我市自1992年发现首例艾滋病病毒感染者截至目前，累计发现艾滋病病人及感染者140余例，属于低流行区。近年来女性感染者的比例和经性途径感染的比例逐年上升，疫情呈现由高危人群向一般人群扩散的趋势。
- ▶ **监测和检测网络的建立：**建立了遍布全市的艾滋病筛查实验室46家，每年进行重点人群及常规检测约20万人次。建立了5个国家级和省级监测哨点，观察我市疫情动态。建立了咨询门诊33家，在全市范围内提供咨询检测服务。



我市男男性行为人群干预工作情况

- 由于男男性行为人群基数较大、分布广、人群较隐蔽、不易接触，给有效的干预工作带来较大难度。
- 近年来，随着我市男男性行为人群艾滋病流行呈快速上升趋势，男男性行为人群的艾滋病防治工作越来越多得到重视，政府、专业机构、社会团体、民间组织共同开展了一系列针对男男性行为人群的艾滋病防治工作，并取得了一定效果。

一、领导支持 经费保障

- 领导的理解和支持是男同干预工作的基本保证。
- 充足的经费是干预工作顺利开展的前提。

二、对目标人群的基本情况充分了解

调查方式

☉ 找知情人了解情况：酒吧老板、圈内有影响的人物、彩虹工作组成员

☉ 网上查询：同志网站

<http://www.touchv.com/>

花醉红尘 滚滚红尘

中国同志活动地点指南

山东省 山东同志网站

☉ 实地考察



调查内容

- 目标人群的活动地点、时间
- 目标人群的人数、类别
- 目标人群的活动方式、活动规律



三、接近目标人群是干预工作的前提

通过宣传——请进来

✓ 充分发挥网络、热线、咨询检测点等资源进行宣传和信息传递。

✓ 志愿者培训班

通过外展——走出去

✓ 流动检测车——

到酒吧、公园等活动场所定期检测
红丝带派对、情人节、圣诞节等
大型活动现场宣传检测

✓ 志愿者外展宣传



2007世界艾滋病日宣传活动



- 当天我们还向市区2万移动通讯用户发送了防治艾滋病知识和信息的温馨提示短信。
- 通过手机短信向市民宣传艾滋病防治知识。



大学校园广泛开展宣传活动



大学生志愿者在校园巡回演讲



大学生志愿者防艾知识培训



大学生防艾志愿者宣誓大会



大学生防艾志愿者在农村、工地、社区宣传



农村大集宣传

工地宣传

社区宣传

现场检测

空姐刘欣防艾志愿者小组在飞机上宣传防艾知识



红丝带志愿者小组在火车站宣传



援艾志愿者小组在时代广场宣传



各类媒体大量报道宣传活动





四、志愿者是开展干预工作主要力量

多层面发展志愿者

在圈内有号召力的、有影响力的、有组织能力的、愿意参与同伴教育的、热心参与的圈外人员

倡导积极的生活方式



同伴教育:

我们定期对男性同性恋志愿者进行培训，提高了艾滋病防治知识和个人防护技能，通过他们在同性恋人群中通过发放宣传手册、举办知识讲座、召开联谊会等多种形式，开展艾滋病防治知识宣传教育，还利用网络平台广泛宣传及时检测的重要性，大力宣传和推广正确使用安全套预防艾滋病知识，提高他们自我保护意识和技能，使更多的有高危行为的同性恋者及时进行HIV检测。

彩虹工作组同伴教育





男同性恋酒吧采血现场



男性同性恋活动场所流动采血车现场采血



充分发挥男男性行为人群参与艾滋病防治工作的主动性和积极性。

通过彩虹工作组广泛开展同伴教育

- 定期开展外展工作
- 利用酒吧举办大型活动时开展红丝带派对活动
- 积极申请项目资助
全球基金项目 北京知爱行信息咨询中心
- 建立同伴教育网络



- 外展：每周4次外展，星期2，5，6，7下午为毓璜顶公园，晚上为虹口花园和酒吧。主要进行、宣传手册、预约卡和安全套的发放。



- 进一步加强与疾控的交流，进一步扩大检测和监测的同性恋人群的范围。
- 依靠网络和工作小组进一步加大爱滋病与性病基础知识的普及。
- 举办多层次的培训和座谈，以及多样的健康的户外活动。
- 加大外展的力度，提高志愿者的素质
- 组成大学生MSM联盟，开展大学生“爱滋病干预”
- 继续通过舆论，消除大众对本群体的歧视，使工作更加顺利



五、做好感染者性伴个案追踪非常重要

- 建立信任的关系
- 耐心说服教育
- 慢慢引导找出接触者
- 寻找蛛丝马迹进行个案追踪

六、目前工作进展情况

- 截至目前我们累计检测男性同性恋者836人，并进行了行为学问卷调查。检出感染者28人，检出率3.3%，其中10例发病，3例死亡，7例正在抗病毒治疗。
- 艾滋病咨询基本覆盖全市MSM人群的70%以上，在接受相关咨询的人中，检测率达60%以上。

六、目前工作进展情况

- 干预前行为学监测资料表明：不安全性行为广泛存在，占95%，安全套使用率：一直使用的只占10%左右，从来不用的占58%。
 - 通过实施安全套推广使用、规范化性病诊疗服务等有效干预措施。目前MSM人群安全套使用率达到70%以上。为90%以上有性病求医需求者提供规范的性病诊疗服务。
 - 落实国家“四免一关怀”政策，抗病毒治疗工作覆盖该人群中所有发现的符合治疗标准的病人。
-

七、思考

- 男性同性恋干预工作是一项长期艰苦的工作。
 - ✓ 志愿者队伍的不稳定
 - ✓ 人的意识的改变需要一定的时间
 - ✓ 目标人群本身的特点
-